



Rosa Damascena Variegata.

P. J. Redouté pinxit.

Rosier d'York et de Lancastre.

Ingrawson del. Remond.

Bessey sculp.

LES ROSES.

137

ROSA DAMASCENA

Variegata. (Voyez page 110, var. 2.)

R. Germinibus oblongis; pedunculis petiolisque hispido et glandulosis; aculeis ramorum sparsis, rectis; foliis oblongis subtus villosis; petalis fragrantibus albis et striatis. ANDR. ROSES, cum fig.

LE ROSIER D'YORCK ET LANCASTRE.

DESCRIPTION.

Les tiges adultes de cet arbrisseau sont munies d'aiguillons rares, épars, recourbés, à peine dilatés à leur base. Les branches florifères sont hérissées d'aiguillons inégaux, rougeâtres, les uns très-faibles, les autres plus forts. Les feuilles se composent de cinq ou de sept folioles ovales-aiguës, entières à leur base, d'un verd-gai en-dessus, plus pâles et pubescentes en-dessous comme sur leur bordure, simplement et peu profondément dentées; elles sont supportées par un pétiole velu, couvert de petites glandes sessiles et rougeâtres, ayant à sa base des stipules bilobes, un peu tomenteuses. Les fleurs, qui répandent une odeur suave, croissent plusieurs ensemble à l'extrémité des rameaux, et forment, par leur réunion, une espèce de panicule lâche. Les tubes des calices, amincis aux deux extrémités, et un peu renflés vers le milieu, sont, ainsi que le pédicelle allongé qui les supporte, hérissés d'une multitude de glandes visqueuses et odorantes. Chaque pédicelle est muni à sa base de deux bractées ovales-pointues, pubescentes en leur bord. Les lobes du calice, trois pinnatifides et deux simples, sont allongés, spatulés au som-